

Packungsbeilage Kamagra 100mg / Kamagra Oral Jelly

Kamagra 100mg Filmtabletten Sildenafil

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen. Bewahren Sie dieses Merkblatt auf. Sie müssen es vielleicht noch einmal lesen. Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

In diesem Faltblatt:

- Was ist Kamagra?
- Kamagra 100mg und wofür wird es verwendet?
- Was Sie vor der Einnahme von Kamagra wissen sollten.
- Wie wird Kamagra 100mg eingenommen?
- Mögliche Nebenwirkungen
- Wie bewahren Sie Kamagra 100mg auf?

Zusätzliche Informationen

Kamagra 100mg ist der Markenname für Sildenafil Citrate von Ajanta Pharmaceutical. Hergestellt wird es von dem indischen Pharmaunternehmen Ajanta Pharmaceutical in Mumbai. Der indische Pharmariese Ajanta Pharma Ltd. erzielte im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit acht internationalen Joint Ventures einen Jahresumsatz von über 30 Millionen Dollar.

Kamagra 100mg ist identisch mit der Wirkung von Pfizer Viagra. Alle Indikationen für die Verwendung von Sildenafilcitrat gelten sowohl für Viagra als auch für Viagra-Generika wie Kamagra 100mg, Caverta, Veega und Silagra. Auch bei Kamagra® können die gleichen Nebenwirkungen auftreten, wie z.B. leichte Kopfschmerzen oder Gesichtsrötung. Es ist ein Mythos, dass es dem Hersteller von Kamagra® gelungen ist, diese Nebenwirkungen zu reduzieren. Kamagra 100mg ist eine exakte billige Kopie der international patentierten Viagra-Pille von Pfizer.

Der indische Hersteller von **Kamagra 100mg** kann diese Pille in seinem Land ohne größere Investitionen herstellen. Nur das Herstellungsverfahren ist in Indien geschützt, so dass er dieses Medikament als billiges "generisches Äquivalent" für Viagra registrieren lassen kann. Voraussetzung für die Zulassung eines Generikums als preiswertes Äquivalent ist, dass das Endergebnis des Produktionsprozesses eine mit dem westlichen Originalpatent völlig identische Pille ergibt. Dies ist die Garantie dafür, dass generisches Viagra tatsächlich die gleiche Qualität liefert wie das echte Viagra von Pfizer. In beiden Pillenarten sind also die gleichen Wirkstoffe in gleicher Menge enthalten.

Was ist Kamagra® und wofür wird es verwendet?

Kamagra® gehört zur Gruppe der so genannten Phosphodiesterase-Typ-5-Hemmer". Das Medikament entspannt die Blutgefäße im Penis, so dass das Blut bei sexueller Erregung in den Penis fließen kann. Sie erhalten mit Kamagra® nur dann eine Erektion, wenn Sie sexuell erregt sind. **Kamagra 100mg** sollte nicht von Frauen eingenommen werden. Kamagra 100mg wird zur Behandlung von Männern mit erektiler Dysfunktion, auch Impotenz genannt, eingesetzt. Dies ist der Fall, wenn ein Mann keine ausreichende Erektion für sexuelle Aktivitäten bekommen oder aufrechterhalten kann.

Was sollten Sie vor der Einnahme von Kamagra® wissen?

Kamagra nicht einnehmen

- wenn Sie Arzneimittel einnehmen, die Nitrate enthalten oder Stickstoffmonoxid freisetzen, wie z. B. Amylnitrit ("Poppers"). Diese Arzneimittel werden häufig zur Linderung von Angina pectoris (oder "Brustschmerzen") eingesetzt. Kamagra® kann die Wirkung dieser Medikamente deutlich verstärken. Bitte teilen Sie Ihrem Arzt mit, dass Sie diese Arzneimittel einnehmen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Sildenafil oder einen der sonstigen Bestandteile von Kamagra® sind.
- Wenn Sie ein schweres Herz- oder Leberproblem haben, wenn Sie vor kurzem einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hatten oder wenn Sie einen niedrigen Blutdruck haben, wenn Sie eine bestimmte, seltene erbliche Augenkrankheit haben (wie Retinitis pigmentosa), wenn Sie jemals einen Sehverlust aufgrund einer nicht-arteriellen anterioren ischämischen Optikusneuropathie (NAION) hatten, seien Sie besonders vorsichtig mit Kamagra®.

Informieren Sie Ihren Arzt

- wenn Sie an Sichelzellenanämie (einer Anomalie der roten Blutkörperchen), Leukämie (Blutzellenkrebs), Multiplem Myelom (Knochenmarkkrebs) oder einer Erkrankung oder Missbildung Ihres Penis leiden. Diese Bedingungen erfordern besondere Vorsicht bei der Einnahme von Medikamenten gegen Erektionsstörungen.
- wenn Sie Herzprobleme haben. In diesem Fall sollte Ihr Arzt sorgfältig prüfen, ob Ihr Herz der zusätzlichen Belastung durch sexuelle Aktivität gewachsen ist.
- wenn Sie ein Magengeschwür oder eine Blutungsstörung (z. B. Hämophilie) haben.
- Wenn Sie plötzlich eine Verminderung oder einen Verlust der Sehkraft feststellen, beenden Sie die Einnahme von Kamagra® und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt. Sie sollten Kamagra® nicht in Kombination mit anderen Medikamenten gegen erektile Dysfunktion verwenden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Kinder

Kamagra 100mg sollte nicht von Kindern unter 18 Jahren eingenommen werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Patienten mit Nieren- oder Leberproblemen

- Sie sollten Ihren Arzt informieren, wenn Sie Nieren- oder Leberprobleme haben. Ihr Arzt kann beschließen, eine niedrigere Dosis zu verschreiben.

Verwendung in Kombination mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder kürzlich eingenommen haben. Dies gilt auch für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel. Kamagra 100mg-Tabletten können die Wirkung bestimmter Arzneimittel beeinflussen, insbesondere derjenigen, die zur Behandlung von "Brustschmerzen" eingesetzt werden. Im Falle eines medizinischen Notfalls sollten Sie der behandelnden Person Folgendes mitteilen: Sie haben Kamagra 100mg verwendet. Verwenden Sie Kamagra® nicht in Kombination mit anderen Arzneimitteln, es sei denn, Ihr Arzt hat Ihnen dazu geraten. Kamagra® kann die Wirkung von Arzneimitteln wie Nitraten und Stickstoffmonoxid-freisetzenden Mitteln wie Amylnitrit ("Poppers") deutlich verstärken. Diese werden üblicherweise zur Linderung von Angina pectoris (oder "Brustschmerzen") eingesetzt.

Sie sollten Kamagra® NICHT einnehmen, wenn Sie diese Arzneimittel einnehmen.

Wenn Sie Proteaseinhibitoren einnehmen, z. B. zur Behandlung von HIV, kann Ihr Arzt Sie bitten, mit der niedrigsten Dosis von Kamagra® zu beginnen. Bei einigen Patienten, die Alphablocker zur Behandlung von Bluthochdruck oder Prostataproblemen erhalten, kann es beim Aufstehen zu Schwindel oder Benommenheit kommen. Dies sind Symptome einer orthostatischen Hypotonie, d. h.

eines niedrigen Blutdrucks bei

bedeutet, sich schnell aufzusetzen oder aufzustehen. Bei einigen Patienten sind diese Symptome bei gleichzeitiger Einnahme von Kamagra® und Alphablockern aufgetreten. Diese treten am ehesten innerhalb von 4 Stunden nach der Einnahme von Kamagra® auf. Um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser Symptome zu verringern, sollte Ihre tägliche Dosis des Alphablockers konstant sein, bevor Sie mit der Einnahme von Kamagra® beginnen. Ihr Arzt kann Ihnen eine Anfangsdosis von 25 mg Kamagra® verschreiben. **Einnahme von Kamagra® mit Speisen und Getränken**

Wenn Kamagra® mit Nahrung eingenommen wird, kann es etwas länger dauern, bis Kamagra® wirkt.

Schwangerschaft und Stillen

Kamagra® ist nicht für die Einnahme durch Frauen geeignet.

Fahren und Bedienen von Maschinen

Kamagra® kann Schwindelgefühle verursachen und Ihre Sehkraft beeinträchtigen. Sie sollten wissen, wie Sie auf Kamagra® reagieren, bevor Sie ein Kraftfahrzeug führen.

Wichtige Informationen über einige der Inhaltsstoffe von Kamagra®

Bitte nehmen Sie Kamagra® erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern, wie z. B. Laktose, leiden.

Wie wird Kamagra® eingenommen?

Sie nehmen Kamagra® etwa eine Stunde vor der sexuellen Aktivität ein. Schlucken Sie die Tablette* unzerkaut mit etwas Wasser. Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Kamagra® zu stark oder zu schwach ist, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Kamagra® verhilft Ihnen nur dann zu einer Erektion, wenn Sie sexuell erregt sind. Die Zeit, bis Kamagra® zu wirken beginnt, ist von Person zu Person unterschiedlich, dauert aber normalerweise zwischen einer halben und einer Stunde. Es kann länger dauern, bis Kamagra® wirkt, wenn Sie eine schwere Mahlzeit eingenommen haben. Der Genuss von Alkohol kann die Erektionsfähigkeit vorübergehend beeinträchtigen. Um die maximale Wirkung dieses Medikaments zu erzielen, sollten Sie vor der Einnahme von Kamagra® keine großen Mengen Alkohol trinken. Wenn Kamagra® Ihnen nicht hilft, eine Erektion zu bekommen, oder wenn die Erektion nicht lange genug anhält, um den Geschlechtsverkehr zu vollenden, sollten Sie Ihren Arzt informieren. Nehmen Sie Kamagra® nicht öfter als einmal am Tag ein.

* Mit dem flüssigen Kamagra oder Kamagra Oral Jelly sollten Sie das flüssige Gel zusammen mit einem Glas Wasser oral einnehmen.

Was ist zu tun, wenn Sie mehr Kamagra® eingenommen haben, als Sie sollten?

Dosierungen über 100 mg erhöhen die Wirkung nicht. Die Zahl der Nebenwirkungen nimmt jedoch zu, und sie können auch schwerwiegender sein. Sie sollten nicht mehr Tabletten einnehmen, als Ihnen Ihr Arzt verordnet hat. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie mehr Tabletten als verordnet eingenommen haben. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Mögliche Nebenwirkungen von Kamagra 100mg

Wie alle Arzneimittel kann auch Kamagra® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Diese sind in der Regel leicht bis mittelschwer ausgeprägt. In kontrollierten klinischen Studien waren die häufigsten Nebenwirkungen Kopfschmerzen oder Hautrötungen und seltener Verdauungsstörungen, Schwindel, verstopfte Nase, Herzklopfen oder Auswirkungen auf das Sehvermögen (einschließlich Farbabweichungen, erhöhte Lichtempfindlichkeit oder verschwommenes Sehen). Wenn Sie etwas haben

Wenn Sie eine Erektion erleben, die länger als 6 Stunden anhält, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt. Wenn Sie während oder nach einer sexuellen Aktivität Schmerzen in der Brust haben, sollten Sie keine Nitratre einnehmen, sondern sich sofort an Ihren Arzt wenden.

Muskelschmerzen können auftreten, wenn Kamagra® mehr als einmal am Tag eingenommen wird. Wenn eine der Nebenwirkungen schwerwiegend wird oder wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt.

Wie wird Kamagra® aufbewahrt?

Außerhalb der Reichweite und Sichtweite von Kindern aufbewahren. Unter 30 Grad lagern. In der Originalverpackung aufbewahren, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie dürfen Kamagra® nach dem auf der Blisterpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Medikamente sollten nicht über das Abwasser oder den Hausmüll entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, was mit Arzneimitteln zu tun ist, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Diese Maßnahmen werden zum Schutz der Umwelt beitragen.

Zusätzliche Informationen

Was ist in Kamagra® enthalten?

Der Wirkstoff ist **Sildenafil**. Jede Tablette enthält **100 mg** Sildenafil (als Citrat). Die anderen Zutaten sind: Tablettenkern: mikrokristalline Cellulose, wasserfreies Calciumhydrogenphosphat, Natriumcroscarmellose, Magnesiumstearat. Filmüberzug: Hypromellose, Titandioxid (E171), Laktose, Triacetin, Indigokarmin-Aluminium-Lack (E132).

Wo kann man Kamagra® im Original bestellen?

Kamagra®-Produkte sind offiziell unter <https://www.erectionpills.store/nl/> für den niederländischen Markt erhältlich, die normale Website ist für britische Verbraucher bestimmt. Sie sind die einzigen Verkäufer von Tabletten mit dem "Ajanta Pharma-Logo". Die Originaltabletten tragen auf der einen Seite den Schriftzug "KG" und auf der anderen Seite das Logo von "Ajanta Pharma".

Kamagra 100 mg ist in Streifenpackungen mit 4 oder 12 Tabletten erhältlich.

Wie Kamagra® aussieht und der Inhalt der Packung

Kamagra® Filmtabletten sind grün und haben eine abgerundete Rautenform. Sie sind auf der einen Seite mit dem Logo von **Ajanta Pharma** und auf der anderen Seite mit "KG" gekennzeichnet. Kamagra 100 mg ist in Streifenpackungen mit 4 oder 12 Tabletten erhältlich.